

Změny v udělování terapeutických výjimek platné od 1.1.2017

A.

Při aplikaci glukokortikoidů je rozdílný postup, který závisí na způsobu podání látky.

Při lokální aplikaci léku obsahujícího glukokortikoid není třeba nic oznamovat.

Za lokální aplikaci se považuje použití mastí, krémů, očních nebo ušních kapek, inhalačních sprejů pro ORL terapii, inhalačních léků při léčbě respiračních obtíží, nitrokloubních aplikací, cílených injekcí do šlachových pochev a cílených aplikací do okolí nervů.

Při aplikaci, která ovlivní organismus celkově, je nezbytné požádat o udělení Terapeutické výjimky. Takovou aplikací glukokortikoidu je např. podání léku ve formě tablet, i.v. injekce, intramuskulární injekce, případně rektální aplikace. Žádost na vyplněném formuláři musí být doprovázena podrobnou lékařskou dokumentací s kopiemi vyšetření a biochemických nálezů.

B.

Všichni selektivní i neselektivní beta2-agonisté, včetně všech optických isomerů, jsou zakázáni. Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně): fenoterol, formoterol, higenamin, indakaterol, olodaterol, prokaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin, vilanterol.

Clenbuterol je rovněž zcela zakázán, pro svůj anabolický efekt je uveden v seznamu zakázaných látek ve skupině S1 anabolické látky.

Při léčbě astmatu br., EIA, EIB (tělesnou zátěží indukované asthma, tělesnou zátěží indukovaný bronchospasmus), je od dříve nezbytné terapeutické výjimky zcela osvobozeno inhalační podávání:

salbutamolu (Ventolin, Buventol, Ecosal easi-breathe, atd.)

salmeterolu (i v kombinaci s glukokortikoidem – Duaspir, Seretide, samostatně Serevent)

formoterolu (např. Formano, Foradil), rovněž i v kombinaci s glukokortikoidem (Symbicort).

Terapeutická dávka při léčbě salbutamolem by neměla být vyšší než 1600 mikrogramů/24 hod. v intervalu 12 hod je nejvyšší dávka 800 mikrogramů, a při léčbě formoterolem je nejvyšší povolená dávka 54 mikrogramů/24 hod, u salmeterolu je povolená nevyšší dávka 200 mikrogramů za 24 hod.


Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml je považována za pozitivní nález, pokud sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním terapeutické dávky (v inhalaci) nižší než výše uvedená maximální dávka.

Použití terbutalinu (Bricanyl) a dalších inhalačních beta2-agonistů je stále vázáno na udělení Terapeutické výjimky. I v tomto případě je nutné k vyplněnému formuláři žádosti o udělení Terapeutické výjimky přiložit:

lékařskou zprávou o průběhu a léčbě onemocnění

kopii funkčního vyšetření dýchání, které prokazuje poruchu funkce průdušek a její ovlivnění beta2 agonistou.

klinickou studií, která prokazuje, že nelze použít pro terapii podmíněně povoleného beta2-agonisty (salbutamolu, salmeterolu, formoterolu).



Antidopingový výbor ČR

Czech Anti-Doping Committee

KOMISE PRO TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY, ZA CÍSAŘSKÝM MLÝNEM 1063, 17000 PRAHA 7

TEL. 233 382 701, FAX 233 382 701, paul@antidoping.cz

Sportovci, kteří jsou zařazeni v Registru pro Testování příslušné mezinárodní sportovní federace, nebo se hodlají účastnit mezinárodních soutěží (vyjmenovaných touto federací), a jsou léčeni léky obsahujícími jiné beta2 agonisty kromě formoterolu, salbutamolu a salmeterolu, musí nejpozději 30 dní před soutěží podat vyplněný standardní formulář o udělení Terapeutické výjimky (i s lékařskou zprávou a kopií funkčního vyšetření, prokazující poruchu funkce průdušek) na příslušnou mezinárodní federaci. Ostatní sportovci zašlou žádost ADV ČR. Podrobnosti na www.antidoping.cz. Sportovci mohou použít i on-line systému ADAMS

MUDr. Tomáš Paul

Komise pro Terapeutické výjimky při ADV ČR